

化学療法レジメン 胃癌⑳

トラスツズマブ+XP(2回目投与以降)

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m ²)	クール目
告知	有	無	投与周期	2週間投与 1週間休薬	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第1日目

月 日

[:]

ボトル①
生食 250ml 1V
トラスツズマブ 0 mg

(トラスツズマブ 6mg/kg)

ボトル②
生食 100ml 1V
デカドロン(3.3mg) 3A
パロノセトロン(0.75mg) 1筒

ボトル③
生食 500ml 1V
シスプラチン 0 mg
CDDP 80mg/m²

ボトル④
生食 1000ml 1V

ボトル⑤
マンニットT(500ml) 1V

点滴

ボトル①

30分



ボトル②

30分



ボトル③

2時間



ボトル④

8時間




ボトル⑤

2時間




内服



※ゼローダの投与量 (体表面積あたり)
1.36m²未満 1回1200mg(4錠)
1.36m²以上~1.66m²未満 1回1500mg(5錠)
1.66m²以上~1.96m²未満 1回1800mg(6錠)
1.96m²以上 1回2100mg(7錠)

内服
ゼローダ (300mg)
()錠 分2後 14日間
第1日目の夕食後より開始

①の点滴開始時
イメンド(125mg) 1C



第2日目

月 日 朝後

内服

イメンド(80mg) 1C

第3日目

月 日 朝後

内服

イメンド(80mg) 1C