

化学療法レジメン 胃癌⑱ トラスツズマブ+XP(初回投与)

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)	体表面積(m ²)		クール目
告知	有 無	投与周期	2週間投与	1週間休薬	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第1日目

月 日


[:]

点滴

ボトル①


①の点滴開始時
イメンド(125mg) 1C

ボトル①
 生食 250ml 1V
 トラスツズマブ 0 mg
 (トラスツズマブ 8mg/kg)




ボトル②

ボトル②
 生食 100ml 1V
 デカドロン(3.3mg) 3A
 パロノセトロン(0.75mg) 1筒



ボトル③

ボトル③
 生食 500ml 1V
 シスプラチン 0 mg
 CDDP 80mg/m²




ボトル④

ボトル④
 生食 1000ml 1V



ボトル⑤

ボトル⑤
 マンニットT(500ml) 1V



内服

※ゼローダの投与量 (体表面積あたり)

1.36m ² 未満	1回1200mg(4錠)
1.36m ² 以上~1.66m ² 未満	1回1500mg(5錠)
1.66m ² 以上~1.96m ² 未満	1回1800mg(6錠)
1.96m ² 以上	1回2100mg(7錠)

内服
 ゼローダ (300mg)
 ()錠 分2後 14日間
第1日目の夕食後より開始

第2日目

月 日 朝後

内服

イメンド(80mg) 1C

第3日目

月 日 朝後

内服

イメンド(80mg) 1C