

化学療法レジメン 胃癌⑪ トラスツズマブ+XP初回投与ショートハイドレーション

ID	@09PATIENT	科名	@USERBE	氏名	@PATIENTNAME		
身長(cm)	\$身長_01	体重(kg)	\$体重_01	体表面積(m ²)	#VALUE!		クール目
告知	有	無	投与周期	2週間投与	1週間休薬	指示者	
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体		HCV	

第1日目

月 日

点滴

[:]

ボトル①
 生食250ml 1V

ボトル①

60分

[:]

ボトル②
 生食 100ml 1V
 デカドロン(3.3mg) 3A
 パロノセトロン(0.75mg) 1筒

ボトル②

30分

②の点滴開始時
イメンド(125mg) 1C

[:]

ボトル③
 生食 250ml 1V
 トラスツズマブ #VALUE! mg
 (トラスツズマブ 8mg/kg)

ボトル③

90分

[:]

ボトル④
 ソリタT3 500ml 1V
 硫酸マグネシウム補正液(20ml) 8m

ボトル④

60分

[:]

ボトル⑤
 マンニットT(500ml) 1V

ボトル⑤

60分

[:]

ボトル⑥
 生食 500ml 1V
 シスプラチン #VALUE! mg
 CDDP 80mg/m²

ボトル⑥

1時間

[:]

ボトル⑦
 生食 500ml 1V

ボトル⑦

1時間

内服

※ゼローダの投与量 (体表面積あたり)
 1.36m²未満 1回1200mg(4錠)
 1.36m²以上~1.66m²未満 1回1500mg(5錠)
 1.66m²以上~1.96m²未満 1回1800mg(6錠)
 1.96m²以上 1回2100mg(7錠)

内服
 ゼローダ (300mg)
 ()錠 分2後 14日間
第1日目の夕食後より開始

第2日目

月 日 朝後

内服

← イメンド(80mg) 1C

第3日目

月 日 朝後

内服

← イメンド(80mg) 1C