

# 化学療法レジメン 胆道癌①

## GCS療法(外科)

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m <sup>2</sup> )	クール目
告知	有	無	投与周期	2週間毎	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第1日目  月  日

**内服**

**点滴**

[ : ]  
**ボトル①**  
 生食 100ml 1V  
 テカドロン(3.3mg) 2A  
 パロノセトロン(0.75mg) 1筒

**ボトル①**

30分

①の点滴と同時  
イメンド(125mg) 1C

[ : ]  
**ボトル②**  
 ラクテック 500ml 1V

**ボトル②**

60分

[ : ]  
**ボトル③**  
 生食 500ml 1V  
 シスプラチン 0 mg  
 CDDP 25mg/m<sup>2</sup>

**ボトル③**

120分

[ : ]  
**ボトル④**  
 生食 1000ml 1V

**ボトル④**

120分

[ : ]  
**ボトル⑤**  
 生食 100ml 1V  
 ジェムザール 0 mg  
 GEM 1000mg/m<sup>2</sup>

**ボトル⑤**

30分

[ : ]  
**ボトル⑥**  
 生食 50ml 1V

**ボトル⑥**

10分

月  日 夕食後～

**内服**

内服  
 エスワン ( )mg  
 ( )錠 分2後 7日間

※エスワンの投与量 (体表面積あたり)  
 1.25m<sup>2</sup>未満 1回40mg  
 1.25m<sup>2</sup>以上～1.5m<sup>2</sup>未満 1回50mg  
 1.5m<sup>2</sup>以上 1回60mg

第2日目  月  日(朝後)

**内服**

← **イメンド(80mg) 1C**

第3日目  月  日(朝後)

**内服**

← **イメンド(80mg) 1C**