

化学療法レジメン 大腸癌⑨ mFOLFIRI療法

ID		科名		氏名	
身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)	クール目		
告知	有	無	投与周期	2週間毎投与	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第1日目 月 日

側管ルート


点滴①開始1時間前に
イメンド(125)1C 内服

メインルート

開始時、生食20ml でフラッシュ

[:]

カンプトとレボホリナートとは
同時滴下開始




①
生食(100ml)
デキサメタゾン(3.3mg) 2A
パロノセトロン(0.75mg) 1筒

施行者印

[:]

①A
5%ブドウ糖 250ml
カンプト 0 mg
(カンプト 150mg/m²)



②
5%ブドウ糖 250ml
レボホリナート 0 mg
(レボホリナート 200mg/m²)

[:]

①B
生食(50mL) 1V
5-FU 0 mg
(5FU 400mg/m²)



③
バクスターインヒューザー-LV5 (250ml 5ml/hr)
5FU 0 mg
生食で計230ml (5FU 2400mg/m²)

終了後、ヘパリン10ml でロック

第2日目 月 日 朝後

内服

←

イメンド(80mg) 1C

第3日目 月 日 朝後

内服

←

イメンド(80mg) 1C