

化学療法レジメン 大腸癌⑥ ベクティックス + mFOLFOX6療法

ID		科名		氏名	
身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)	クール目		
告知	有	無	投与周期	2週間毎投与	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第1日目 月 日

側管ルート

メインルート

開始時、生食20ml でフラッシュ

ベクティックス開始時に
イメンド(125)1C 内服



60分

#	生食(100ml)	1V					
	ベクティックス		0 mg				
	(ベクティックス 6mg/kg)						

施行者印

10分

①	生食	50mL					
---	----	------	--	--	--	--	--

30分

②	生食(100ml)	1V					
	デキサドロン(3.3mg)		2A				
	パロノセトロン(0.75mg) 1筒						

*レボホリナートとエルプラットは
同時に並列で！

2時間

2時間

③	5%ブドウ糖	250ml					
	エルプラット		0 mg				

(エルプラット 85mg/m²)

④	5%ブドウ糖	250ml					
	レボホリナート		0 mg				

(レボホリナート 200mg/m²)

全開
10分

46時間

⑤	生食(50mL)	1V					
	5-FU		0 mg				
	(5FU 400mg/m ²)						

⑥	パクスターインヒューザー-LV5	(250ml 5ml/hr)					
	5FU		0 mg				
	生食で計230ml (5FU 2400mg/m ²)						

終了後、ヘパリン10ml でロック

第2日目 月 日朝後

内服

イメンド(80mg) 1C

第3日目 月 日朝後

内服

イメンド(80mg) 1C