

化学療法レジメン 大腸癌⑤ サイラムザ + mFOLFIRI-2療法

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m ²)	クール目
告知	有	無	投与周期	2週間毎投与	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV


第1日目 月 日

側管ルート

メインルート


開始時、生食20ml でフラッシュ

[:]



①
生食(100ml) 1V
デカドロン(3.3mg) 2A
パロノセトロン(0.75mg)1筒
ポララミン(5mg) 1A
ファミチジン(20mg) 1A



[:]



②生食 50mL

[:]


サイラムザ開始時に
イメンド(125)1C 内服



③
生食(250ml) 1V
サイラムザ 0mg
(サイラムザ 8mg/kg)

施行者印

[:]




④生食 100mL 1V

カンプトとレボホリナートとは
同時滴下開始

[:]


⑤
5%ブドウ糖 250ml
カンプト 0mg
(カンプト 150mg/m²)



⑥
5%ブドウ糖 250ml
レボホリナート 0mg
(レボホリナート 200mg/m²)

[:]

⑦
生食(50mL) 1V
5-FU 0mg
(5FU 400mg/m²)



⑧
パクスターインヒューザー-LV5 (250ml 5ml/hr)
5FU 0mg
生食で計230ml (5FU 2400mg/m²)

終了後、ヘパリン10ml でロック

第2日目 月 日朝後

内服

← イメンド(80mg) 1C

第3日目 月 日朝後

内服

← イメンド(80mg) 1C