

## 化学療法レジメン 大腸癌② エスワン+CPT-11療法(大腸癌)


ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m <sup>2</sup> )	ケール目
告知	有 無	投与周期	2週間投与2週間休薬		指示者
HBs抗原	HBc抗体		HBs抗体		HCV

第1日目

月 日夕~

内服

内服  
エスワン ( )mg /日  
分2後 14日間



※エスワンの投与量 (体表面積あたり)  
1.25㎡未満 80mg/日  
1.25㎡以上~1.5㎡未満 100mg/日  
1.5㎡以上 120mg/日

第1日目

月 日

内服

①の点滴開始1時間前  
イメンド(125mg) 1C

点滴

[ : ]

施行者印

ボトル①  
生食 100ml 1V  
デカドロン(3.3mg) 2A  
パロノセトロン(0.75mg) 1筒

ボトル①

30分  
↓



ボトル②  
5%ブドウ糖 250ml 1V  
カンプト 0 mg  
(CPT-11=125mg/㎡)

ボトル②

90分  
↓



ボトル③  
生食 100ml 1V

ボトル③

30分  
↓

第2日目

月 日

内服

← イメンド(80mg) 1C

第3日目

月 日

内服

← イメンド(80mg) 1C

## 化学療法レジメン 大腸癌② エスワン+CPT-11療法(大腸癌)

第15日目

内服

①の点滴開始1時間前  
イメンド(125mg) 1C

点滴

[ : ]

施行者印

**ボトル①**  
 生食 100ml 1V  
 デカドロン(3.3mg) 2A  
 パロノセトロン(0.75mg) 1筒

ボトル①

30分




ボトル②

90分



ボトル③

30分





**ボトル②**  
 5%ブドウ糖 250ml 1V  
 カンプト 0 mg  
 (CPT-11=125mg/m<sup>2</sup>)



**ボトル③**  
 生食 100ml 1V

第16日目

内服

イメンド(80mg) 1C

第17日目

内服

イメンド(80mg) 1C