

# 化学療法レジメン 大腸癌①⑥ ペバシズマブ + mFOLFIRI療法

ID		科名		氏名		
身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m <sup>2</sup> )				クール目
告知	有	無	投与周期	2週間毎投与	指示者	
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体		HCV

第1日目 月 日

側管ルート

メインルート

開始時、生食20ml でフラッシュ

ペバシズマブ開始時に  
イメンド(125)1C 内服

[ : ]

●  
分

#	生食(100ml)	1V				
	ペバシズマブ		0 mg			
	(ペバシズマブ 5mg/kg)					

施行者印

[ : ]

30分

カンプトとレボホリナートとは  
同時滴下開始

①	生食(100ml)	1V				
	デカトロン(3.3mg)		2A			
	パロノセトロン(0.75mg) 1筒					

[ : ]

2時間

2時間

Ⓐ	5%ブドウ糖 250ml					
	カンプト		0 mg			
	(カンプト 150mg/m <sup>2</sup> )					

Ⓑ	5%ブドウ糖 250ml					
	レボホリナート		0 mg			
	(レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> )					

全開  
10分

46時間

Ⓒ	生食(50mL) 1V					
	5-FU		0 mg			
	(5FU 400mg/m <sup>2</sup> )					

③	バクスターインヒューザー-LV5	(250ml 5ml/hr)				
	5FU		0 mg			
	生食で計230ml (5FU 2400mg/m <sup>2</sup> )					

終了時、ヘパリン10ml でロック

第2日目 月 日朝後

内服

イメンド(80mg) 1C

第3日目 月 日朝後

内服

イメンド(80mg) 1C