

## 化学療法レジメン 肺癌⑨ CBDCA+PTX+BEV

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m <sup>2</sup> )	クール目
告知	有 無	投与周期		3 週間毎	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第1日目 [ 月 日 ]

[ : ]

内服


①の点滴投与30分前  
イメンド(125mg) 1C

[ : ]

点滴


内服  
①と同時 レスタミン  
コーワ錠(10mg) 5T

**ボトル①**  
 生食 50ml 1V  
 デキサメタゾン(3.3mg) 5A  
 カイトリル(3mg) 1A  
 ファモチジン(20mg) 1A




[ : ]

**ボトル②**  
 生食 100ml 1V



[ : ]


**ボトル③**  
 生食 500ml 1V  
 パクリタキセル 0 mg  
 PTX 200mg/m<sup>2</sup>



点滴速度注意  
流量 × 1.5倍


[ : ]

**ボトル④**  
 5%ブドウ糖 250ml 1V  
 カルボプラチン mg  
 CBDCA AUC=6



[ : ]

**ボトル⑤**  
 生食 100ml 1V  
 ペバシズマブ 0 mg  
 BEV 15mg/kg




ペバシズマブの投与時間  
初回 90分  
問題なければ 2回目 60分  
問題なければ 以降 30分でも投与可

投与時間は主治医の指示で

[ : ]

**ボトル⑥**  
 生食 100ml 1V



第2日目 [ 月 日(朝後) ]

内服

イメンド(80mg) 1C

第3日目 [ 月 日(朝後) ]

内服

イメンド(80mg) 1C