化学療法レジメン　肺癌④
CBDCA+PEM

ID		科名		氏名			
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m^2)			クール目
告知	有　　無		投与周期	3　週間毎		指示者	
薬剤師確認		□パンビタン(葉酸)投与　　□メチコバール注投与					
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体		HCV	

[　　:　　]

第1日目　月　　日　→　内服　→　①の点滴投与1時間前 イメンド(125mg)　1C

[　　:　　]

点滴

ボトル①
生食　50ml　1V
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)　2A
カイトリル(3mg)　1A

15分

[　　:　　]

ボトル②
生食　100ml　1V
ペメトレキセド　0　mg
PEM　500mg/㎡

10分

ボトル③
5%ブドウ糖　250ml　1V
カルボプラチン　mg
CBDCA　AUC＝6

60分

ボトル④
生食　100ml　1V

30分

第2日目　月　　日(朝後)　→　内服　→　イメンド(80mg)　1C

第3日目　月　　日(朝後)　→　内服　→　イメンド(80mg)　1C

(注意)
葉酸0.5mg/日：調剤用パンビタン末1gを1日1回　投与7日前から最終投与日から22日後まで投与。
ビタミンB12　1mg/回：メチコバール(0.5mg)2Aを投与7日以上前に筋注投与。以後9週間ごとに筋注投与。