

化学療法レジメン 肺癌⑩ CDDP+GEM(DAY1~3)


ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m ²)	クール目
告知	有 無	投与周期	3~4週間毎		指示者
HBs抗原	HBc抗体		HBs抗体		HCV

第1日目

月 日

点滴

- [:]
- ボトル①**
 リナセートD 500ml 1V
- [:]
- ボトル②**
 ソリタT3 500ml 1V
 プリンペラン(10mg) 2A
- [:]
- ボトル③**
 生食 100ml 1V
 デキサメタゾン(3.3mg) 2A
 カイトリル(3mg) 1A
- [:]
- ボトル④**
 生食 100ml 1V
 ジェムザール 0 mg
 GEM 1000mg/m²
- [:]
- ボトル⑤**
 生食 100ml 1V
- [:]
- ボトル⑥**
 生食 500ml 1V
 シスプラチン 0 mg
 CDDP 80mg/m²
- [:]
- ボトル⑦**
 リナセートD 500ml 1V
- [:]
- ボトル⑧**
 ソリタT3 500ml 1V
 プリンペラン(10mg) 2A
- [:]
- ボトル⑨**
 ソリタT1 500ml 1V



内服

 ← ③の点滴と同時
イメンド(125mg) 1C

尿量を見て、主治医の判断で利尿剤投与。

第2日目

月 日(朝後)

内服

← イメンド(80mg) 1C

第3日目

月 日(朝後)

内服

← イメンド(80mg) 1C

化学療法レジメン 肺癌⑩ CDDP+GEM(DAY8)

第8日目

月	日
---	---


[:]

ボトル①		
生食 50ml		1V
デキサメタゾン(3.3mg)		2A
カイトリル(3mg)		1A

点滴

ボトル①

15分



[:]

ボトル②		
生食 100ml		1V
ジエムザール		0 mg
GEM 1000mg/m ²		

ボトル②

30分



[:]

ボトル③		
生食 100ml		1V

ボトル③

30分

