

化学療法レジメン 肺癌⑥ CBDCA+PEM+BEV

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m ²)	ケール目
告知	有	無	投与周期	3 週間毎	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV
薬剤師確認		<input type="checkbox"/> パンピタン(葉酸)投与		<input type="checkbox"/> メチコパール注投与	

第1日目 月 日

[:]

内服

← ①の点滴開始1時間前
イメンド(125mg) 1C

[:]

点滴

ボトル①
 生食 50ml 1V
 デカトロン(3.3mg) 2A
 カイトリル(3mg) 1A

ボトル①
 ↓ 15分

[:]

ボトル②
 生食 100ml 1V
 ペメトレキセド 0 mg
 PEM 500mg/m²

ボトル②
 ↓ 10分

[:]

ボトル③
 5%ブドウ糖 250ml 1V
 カルボプラチン mg
 CBDCA AUC=6

ボトル③
 ↓ 60分

[:]

ボトル④
 生食 100ml 1V
 ベバシズマブ 0 mg
 BEV 15mg/kg

ボトル④
 ↓ 分

ベバシズマブの投与時間
 初回 90分
 問題なければ 2回目 60分
 問題なければ 以降 30分でも投与可
 投与時間は主治医の指示で

[:]

ボトル⑤
 生食 100ml 1V

ボトル⑤
 ↓ 30分

第2日目 月 日(朝後)

内服

← イメンド(80mg) 1C

第3日目 月 日(朝後)

内服

← イメンド(80mg) 1C

(注意)

葉酸0.5mg/日: 調剤用パンピタン末1gを1日1回 投与7日前から最終投与日から22日後まで投与。
 ビタミンB12 1mg/回: メチコパール(0.5mg)2Aを投与7日以上前に筋注投与。以後9週間ごとに投与。