

# 化学療法レジメン 大腸癌⑩ mFOLFOX6療法

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m <sup>2</sup> )	クール目
告知	有	無		投与周期	2週間毎投与
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第1日目 月 日

側管ルート


点滴①開始1時間前に  
イメド(125)1C 内服

メインルート

開始時、生食20ml でフラッシュ

[ : ]

\* レボホリナートとエルプラットは  
同時に並列で！




①  
生食(100ml)  
デカトロン(3.3mg) 2A  
パロノセトロン(0.75mg) 1筒

施行者印

[ : ]



②  
5%ブドウ糖 250ml  
エルプラット 0 mg  
(エルプラット 85mg/m<sup>2</sup>)




③  
5%ブドウ糖 250ml  
レボホリナート 0 mg  
(レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup>)





④  
生食(50mL) 1V  
5-FU 0 mg  
(5FU 400mg/m<sup>2</sup>)



⑤  
ハクスターインヒューザー-LV5 (250ml 5ml/hr)  
5FU 0 mg  
生食で計230ml (5FU 2400mg/m<sup>2</sup>)



終了後、ヘパリン10ml でロック

第2日目 月 日 朝後

内服

← イメド(80mg) 1C

第3日目 月 日 朝後

内服

← イメド(80mg) 1C